



DLP-4 - 2 - 88007804

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA CEDEX
Tél. 61. 24. 06. 51

Régisseur de Recettes
D.R.A.F. "MIDI-PYRÉNÉES"
CCP : 8618-62 Y Toulouse
I.S.S.N. : 0752-2053

PUBLICATION PERIODIQUE

ABONNEMENT ANNUEL : 130 F

BULLETIN N° 2 DU 28 JANVIER 1988

Note commune CETIOM-SRPV ()*

PROTECTION DES SEMIS DE TOURNESOL

► Contre les maladies

Pour éviter les maladies provoquant une fonte des semis, il est indispensable d'utiliser des semences traitées avec les fongicides autorisés pour cet usage.

► Contre les insectes du sol

Le choix d'un produit en traitement du sol doit être guidé par son efficacité sur taupins essentiellement. Les risques les plus grands sont encourus dans le cas de précédents prairies ou de semis précoces.

Utiliser l'un des produits du tableau ci-dessous.

Matière active	dose en g/ha	Spécialité commerciale	dose en kg ou l/ha	Observations
TRAITEMENT EN PLEIN				
lindane	1 500	nombreuses spécialités	1,7	A réserver à de fortes infestations. Traiter 15 jours à 3 semaines avant semis. Action complémentaire sur noctuelles.
chlorpyriphos + lindane	1 500 + 800	LORSBAN L 16, LORSBAN liquide, KREGAN, KREGAN liquide	5	
TRAITEMENT EN LOCALISATION				
bendiocarbe	300	GARVOX 3G, NIOMIL 3G	10	Très actif sur taupins.
benfuracarbe	600	ONCOL 5G	12	Très actif sur taupins.
carbofuran	600	CURATER, DELEX	12	Très actif sur taupins. Active souvent la végétation.
carbosulfan	750	MARSHALL FORT	7,5	Bon sur taupins.
chlorméphos	300	DOTAN	6	Bon sur taupins. Economique.
furathiocarbe	600	DELTANET	12	Très actif sur taupins. Active souvent la végétation. Longue rémanence.
terbuphos	200	COUNTER PLUS	8	Moyen à bon sur taupins. Active souvent la végétation.
chlorthiophos + lindane	237,6 + 136	CELATHION L	8	Moyen à bon sur taupins.
aldicarbe + lindane	500 + 200	TEMIK M	15	Moyen à bon sur taupins.
fonofos + lindane	200 + 100	FOLANE	6	Moyen à bon sur taupins.

(*) CETIOM : Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains - Région SO.
SRPV : Service Régional de la Protection des Végétaux.

P.A.

LUTTE CONTRE LE REVERDISSEMENT DES LABOURS AVANT TOURNESOL ET SOJA

En terrefort argileux ou argilo-calcaire, ou terre franche, ou bon limon.

► Terres propres ou enherbées au 1/12/87

Utiliser : LEGURAME à 4 kg/ha

ou

KERB 50 à 1,5 kg/ha (seulement sur tournesol)

traitement possible jusqu'au 15/2/88

En présence de dicotylédones, ajouter un produit commercial à base de linuron à 500 g de matière active/ha.

► Terres enherbées au 1/1/88

Utiliser : WEEDAZOL à 15 l/ha (attendre 1 mois entre le traitement et le semis de tournesol)

ou

ROUNDUP à 1 l/ha + GENAMIN à 1 l/ha en présence de graminées annuelles

ROUNDUP à 2 l/ha + GENAMIN à 1 l/ha en présence de dicotylédones développées

ROUNDUP à 3 l/ha + GENAMIN à 1 l/ha en présence de vivaces précoces

► Terres enherbées au 15/2/88

Utiliser : GRAMOXONE 2000 à 2 l/ha + AGRAL à 0,5 l/ha en présence de graminées

ou

GRAMOXONE 2000 à 1,5 l/ha + REGLONE à 1,5 l/ha + AGRAL à 0,5 l/ha en présence de graminées et dicotylédones.

DESHERBAGE DE LA CULTURE DE TOURNESOL

Type de sol	Epoques d'application		
	Pré-semis incorporé	Post-semis Pré-levée	Post-levée
Terreforts argileux ou argilo-calcaires ou terres franches	trifluraline 1200 g m.a./ha	RACER ME 2 l	Si on constate la présence de graminées, choisir un des produits ci-dessous
		ou RONSTAR 3 l	
	PROWL 3 l	ou CHALLENGE 3,5 l	
		ou RACER ME 2 l	
Boulbènes ou limons battants	DUELOR 2,2 l	RACER ME 2 l	FERVIN à 1 kg + huile à 3 l ou FERVINAL à 1,5 l + huile à 3 l ou FUSILADE X2 à 0,75 l + AGRAL ou TARGA à 1,25 l ou GALLANT à 1,25 l
		ou RONSTAR 3 l	
	DUELOR 2,2 l + RACER ME 2 l	RACER ME 3 l	
		ou CHALLENGE 4,5 l	
Boulbènes ou limons battants	DUELOR 2,2 l + RONSTAR 2 l	ou RONSTAR 3 l	FERVIN à 1 kg + huile à 3 l ou FERVINAL à 1,5 l + huile à 3 l ou FUSILADE X2 à 0,75 l + AGRAL ou TARGA à 1,25 l ou GALLANT à 1,25 l
		ou DUELOR 2,2 l	
	DUELOR 2,2 l + RONSTAR 2 l	ou DUELOR 2,2 l + RACER ME 2 l	
		ou DUELOR 2,2 l + RONSTAR 2 l	

Remarques

Trifluraline : à utiliser en cas de flore de graminées de moyenne importance

RACER ME : préférer RACER si la flore de crucifères est dominante

RONSTAR : préférer RONSTAR si la flore de renouées est dominante

CHALLENGE 600 : assez complet sur dicotylédones sauf sur morelle, renouée des oiseaux et amarante

DUELOR : utilisé aussi en post-semis, pré-levée, l'incorporation n'étant pas indispensable